




VACCINI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE UNA RISORSA NON ANCORA COMPLETAMENTE COMPRESA

Carla M. Zotti

Dipartimento di Scienze della sanità
Pubblica e pediatriche
Università di Torino

WINTER SCHOOL 2020

**ALIMENTAZIONE PREVENZIONE CURA
NUOVA GOVERNANCE IN SANITÀ**



WHO: «I casi di polio sono diminuiti di oltre il 99% dal 1988 (da 350 000 casi stimati a 33 casi segnalati nel 2018), ma, finché un solo bambino sarà infetto, tutti quelli degli altri Paesi rimarranno a rischio di contrarre la malattia»




America 1994
POLIO FREE

Pacifico Occidentale 2000
POLIO FREE

Europa 2002
POLIO FREE

Asia sud-Orientale 2014
POLIO FREE



Rimangono aree di **endemia: Afghanistan, Nigeria e Pakistan**. In Europa sono considerate a **rischio di importazione e diffusione** Romania, Ucraina, Bosnia Herzegovina,.
Il tipo polio 2 **eradicato** dal 2015.
Il tipo polio 3 **eradicato** nel 2018.
Polio wild type: 2016 **37** casi nel mondo;
nel 2017 **22** casi; nel 2018 **33** casi; nel 2019 **94** casi.

Torino, la bambina colpita da tetano perché non vaccinata lascia la Rianimazione: è salva



Dopo 30 giorni di ricovero lascia finalmente il reparto di Rianimazione la bambina di 7 anni che il 10 ottobre 2017 era stata portata all'ospedale infantile Regina Margherita in preda a spasmi dolorosissimi perché colpita da tetano.

CORRIERE DELLA SERA / PEDIATRIA

padre: "Non sono No

IL CASO

Sardegna, a 10 anni prende il tetano dopo una caduta: non è vaccinato

Il bambino si e
la terapia con i

LA STAMPA ITALIA

SEGUICI SU CARLA

SEZIONI

Cerca...

Gli Obama ospiti in casa Clooney, vacanza blindata sul Lago di Como

Niente chemio alla figlia malata di leucemia, condannati i genitori di Padova

Pedopornografia online: maxi blitz in tutta Italia, 51 indagati; 30 sono minori

Fisco, nei primi 5 mesi del 2019 scoperti 13.000 evasori totali

Ecco le rotte degli sbarchi fantasma. Così vengono dribblati i porti chiusi

Bimba di 10 anni colpita da un'infezione da tetano a Verona: non era vaccinata

Burioni: «Il pericolo è ovunque anche una piccolissima ferita può provocarlo, l'acqua ossigenata e la vitamina C sono inefficaci e soprattutto non esiste una immunità naturale»

LEGGE 119/2017

«LEGGE PREVENZIONE VACCINALE»

Allargamento dell'obbligo vaccinale da 4 a 10 vaccinazioni

Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e 365 gg sono **obbligatorie** e **gratuite** – in base alle specifiche indicazioni del Calendario dell'anno di nascita

VACCINI OBBLIGATORI

ANTI-POLIOMIELITICO
ANTI-DIFTERICO
ANTI-TETANICO
ANTI-EPATITE B
ANTI-PERTOSSE
ANTI-MORBILLO
ANTI-ROSOLIA
ANTI-PAROTITE
ANTI-VARICELLA
ANTI-HAEMOPHILUS TIPO B

VACCINI FORTEMENTE RACCOMANDATI


ANTI-MENINGOCOCCICO B
ANTI-MENINGOCOCCICO C
ANTI-PNEUMOCOCCICO
ANTI-ROTAVIRUS

AMMISSIONE A SCUOLA

Le dieci vaccinazioni obbligatorie costituiscono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni).

MORBILLO

ITALIA: gennaio 2013-dicembre 2018



5393 casi nel 2017; 2526 nel 2018


L'età mediana dei casi è stata pari a 25-27 anni; 8 decessi.

**Il 47% dei pazienti ha riportato almeno una complicanza;
il 58% è stato ricoverato**

Sono stati segnalati 115 casi tra operatori sanitari (4,6% dei casi totali)

Impatto sulle coperture vaccinali

Trend delle coperture vaccinali a 24 mesi (per 100 abitanti),
per MORBILLO (prima dose) - Italia





LA DENUNCIA DI UNA COPPIA DI RICERCATORI

«Soldi alle donne per farle abortire
Usano i feti
per produrre
i vaccini»



«Nei 28 vaccini esaminati non ho trovato dei metalli, ho trovato dei pezzi di metallo! Che è molto peggio! Dei pezzi di acciaio! Dei pezzi di piombo! Micro e nano particelle, non solo, ma dentro ci sono dei globuli rossi animali, dentro ci sono degli spezzoni di DNA animale.... e altro ancora»

INDICE FURFA

PSEUDOSCIENZA

TRA VACCINI E AUTISMO NON C'È CORRELAZIONE, LE DICHIARAZIONI DI MONTAGNIER IN MERITO NON SONO ATTENDIBILI, MA DIVULGARE SENZA VERIFICARE È ORMAI LA PRASSI.

Vaccine Hesitancy....




Fig. 1. The continuum of vaccine hesitancy between full acceptance and outright refusal of all vaccines.

Confidence

- nell'efficacia e nella sicurezza dei prodotti
- nell'affidabilità e nella competenza dei servizi e degli operatori preposti
- nelle motivazioni dei decisori

Complacency...

- Il rischio della malattia da prevenire è basso e la vaccinazione non è ritenuta necessaria;
- Paradossalmente un buon successo di un intervento vaccinale si traduce in una ridotta percezione del rischio.

Convenience

- Accessibilità, disponibilità, attrattività, qualità reale e percepita dei servizi
- Comprensibilità della comunicazione e dell'informazione
- Contesto sociale e culturale dell'offerta influenzano l'accoglienza dell'intervento



GRAZIE DELL'ATTENZIONE.