

FOCUS su VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE




Il reale impatto dell'influenza sulla Salute Pubblica è sottostimato

Si attribuiscono mediamente 8000 decessi per influenza e le sue complicanze ogni anno in Italia

L'influenza è causa silente di complicanze gravi, non solo a carico dell'apparato respiratorio

Un impatto pesante, multidimensionale



Quali sono le indicazioni ministeriali?

Ministero della Salute - Influenza, pubblicata la Circolare con le raccomandazioni per la stagione 2025-2026

4.2 Strategie di vaccinazione contro l'influenza stagionale

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurre le complicanze e che non abbiano specifiche controindicazioni. L'OMS e il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025⁶, riportano, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale, il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni.

Per ciò che concerne l'individuazione dei gruppi a rischio rispetto alle epidemie di influenza stagionale, ai quali la vaccinazione va offerta in via preferenziale, esiste una sostanziale concordanza, in ambito europeo sul fatto che principali destinatari dell'offerta di vaccino antinfluenzale stagionale debbano essere le persone anziane, le donne in gravidanza, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza.

I numeri di dosi che andremo ad analizzare sono fortemente sottodimensionati rispetto agli obiettivi ministeriali

Quali sono iv vaccini ad oggi disponibili in Italia?

Tabella 4. Vaccini somministrabili alle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente, con raccomandazione al vaccino specifico, ove prevista.

TARGET	Tipologie di vaccini antinfluenzali					
	VIQ	VIQa	VIQr	VIQhd	LAIV	VIQcc
Persone di età pari o superiore a 65 anni	S	R	S	R		S
Persone nella fascia di età 60 - 64 anni	S	S	S	S		S
Persone nella fascia di età 50 - 59 anni che rientrano nelle categorie riportate in tabella 3	S	S	S			S
Adulti di età compresa tra i 18 anni e i 49 anni che rientrano nelle categorie riportate in tabella 3	S		S			S
Bambini di età compresa tra i 7 anni e i 17 anni che rientrano nelle categorie riportate in tabella 3	S				S	S
Bambini nella fascia di età 2 – 6 anni	S				S	S
Bambini nella fascia di età 6 mesi - 2 anni	S					
Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum"	S		S			S

S: Somministrabile come da Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

R: Prodotto Raccomandato tra i somministrabili

VIQ - Vaccino Inattivato Quadrivalente sub-unità, split

VIQa - Vaccino inattivato quadrivalente adiuvato

VIQr - Vaccino quadrivalente a DNA ricombinante

VIQhd - Vaccino inattivato quadrivalente ad alto dosaggio

LAIV- Vaccino vivo attenuato trivalente

VIQcc - Vaccino inattivato quadrivalente coltivato su colture cellulari

Nella popolazione over 65 anni si RACCOMANDA l'utilizzo dei vaccini POTENZIATI: VIQa (adiuvato) e VIQhd (AltoDosaggio)


Quali sono gli obiettivi ministeriali?

Pertanto, gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza sono:

- riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte
- riduzione del rischio di trasmissione a persone ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.

La Repubblica Torino 3 gennaio 2025

Crisi annunciata



In 260mila
con l'influenza
pronto soccorso
già intasati

SANITA' E NOTIZIE

Influenza per 500mila. Nei pronto soccorso 200 accessi al giorno

De Iaco: «Importante la prevenzione, un appello alla vaccinazione». Ottime notizie dal Regina Margherita

[Influenza per 500mila. Nei pronto soccorso 200 accessi al giorno - Torino Cronaca - Notizie da Torino e Piemonte](#)

PIEMONTE CAMPAGNA VACCINALE

Anno campagna	Vaccino Standard	Vaccino Adjuvato	Vaccino HD alto dosaggio	Popolazione over 65	Dosi Totali
2023-2024	800.000	150.000	35.000 * solo RSA	1.121.870	985.000 DOSI totali
2024-2025	700.000	150.000	35.000* solo RSA	1.131.252	885.000 DOSI totali
2025-2026	700.000	150.000	50.000*solo RSA	1.131.252 *	900.000 DOSI totali

Come possiamo vedere in tabella 4 della Circolare Ministeriale per la popolazione over 65 sono **RACCOMANDATI** i vaccini potenziati, in Piemonte per l'anno 2025-2026 la proposta offerta da Piemonte copre solo il **17%** della popolazione rispetto alla raccomandazione ministeriale.

L'altro elemento che bisogna considerare è che nella migliore delle ipotesi , tenendo conto della sola popolazione over 65 le quantità messe a gara di vaccini garantirebbero la copertura del 79% della popolazione over 65. Ma il totale delle dosi in realtà serve anche per la vaccinazione della popolazione a rischio al di sotto dei 65 anni, quindi anche qualora tutte le dosi venissero consumate andrebbero a garantire SOLO il raggiungimento dell'obiettivo MINIMO del 75% , da cui siamo comunque molto lontani.

Stagione 2025-2026


La proposta di offerta vaccinale è equa fra le varie regioni di Italia? Alcuni esempi: i numeri sono pubblicati nei bandi di gara delle singole regioni

Regioni	VACCINI RACCOMANDATI OVER 65 ANNI		Vaccini Standard		Popolazione over 65 anni	% DOSI VACCINO RACCOMANDATO
	Efueda HD	Fluad Tetra Aduvato	QIVe (classic)	Flucelvax		
	Dosi a gara	Dosi a gara	Dosi a gara	Dosi a gara		
Liguria	118.600	118.000	160.000	12.100	437.644	54%
Bolzano	57.000	-	20.000	-	239.293*(anche Trento)	
Lombardia	500.000	850.000	1.000.000	110.000	2.356.054	57%
Friuli V.G.	-	200.500	40.000	2.900	324.459	62%
Toscana	240.000	485.000	162.810	-	968.246	75%
Sardegna	119.590	73.608	183.500	44.120	421.300	46%
VdA	3.000	5.000	-	-	31.141	26%
Lazio	170.000	680.000	210.000	215.000	1.337.357	64%
Puglia	80.000	470.000	310.000	80.000	943.014	58%
Campania	238.175	520.960	414.610	55.325	1.169.023	65%
Molise	13.000	30.000	55.000	-	77.535	55%
Piemonte	50.000	150.000	700.000	500	1.131.252	17%

Piemonte è disallineato e lontano dalla Raccomandazione Ministeriale di utilizzo vaccini potenziati su over 65 anni


Vaccinazione antinfluenzale nella popolazione italiana

Stagioni: 1999/00 - 2023/24




Copertura vaccino Antinfluenzale negli anziani (età >= 65 anni)

per Regione




OBIETTIVI DI COPERTURA PER TUTTI I GRUPPI TARGET

Obiettivo minimo



Obiettivo ottimale



Dati sulle vaccinazioni antinfluenzali nella popolazione generale

Le coperture vaccinali nella popolazione generale della stagione 2024/2025, aggiornate alla data del 29 agosto 2025, sono lievemente aumentate (**19,6%**) rispetto alla stagione precedente (**18,9%**).

Dati sulle vaccinazioni antinfluenzali negli anziani

La copertura negli anziani è diminuita di 0,8 punti percentuali rispetto alla stagione precedente portandola al **52,5%** rispetto al 53,3% della stagione 2023-24.

Si conferma quindi un trend in diminuzioni nelle ultime stagioni dopo il picco raggiunto nella stagione pandemica 2020-21 con 65,3%. La diminuzione della copertura vaccinale nella stagione 2024-25 rispetto alla stagione precedente è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane tranne nella PA di Trento, in Piemonte, Lombardia, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna in cui si registra un lieve aumento e nel Friuli Venezia Giulia in cui la copertura è rimasta invariata.

Durante la stagione 2024-2025 (ottobre 2024 – aprile 2025) sono stati segnalati in Italia **601 casi gravi** di influenza confermata in laboratorio e ricoverati in Terapia Intensiva.

Tra i casi segnalati, 134 sono deceduti.

L'andamento dei casi è paragonabile alle stagioni passate, raggiungendo picco nella prima settimana del 2025.

- **La fascia di età più colpita è quella tra i 60-79 anni.**

La maggior parte dei casi presentava una o due comorbidità, tra cui le malattie cardiovascolari costituivano la comorbidità più frequente.

È stato notificato un numero più alto di casi in persone di sesso maschile.

- **Come nelle stagioni passate, la maggior parte dei casi gravi e dei decessi (77,4%) si è verificata in persone che non avevano ricevuto la vaccinazione anti-influenzale nella stagione in corso.**

Effectiveness of high-dose influenza vaccine against hospitalisations in older adults (FLUNITY-HD): an individual-level pooled analysis

In questa analisi aggregata prespecificata, HD-IIV ha dimostrato una protezione superiore rispetto a SD-IIV contro l'ospedalizzazione per influenza o polmonite e ha anche ridotto l'incidenza degli endpoint secondari di ospedalizzazione cardiorespiratoria, ospedalizzazione per influenza confermata in laboratorio e ospedalizzazione per tutte le cause.

Data l'ampia idoneità alla vaccinazione antinfluenzale, l'implementazione di HD-IIV potrebbe comportare notevoli benefici per la salute pubblica.